

# KS

NEORGANINĖS TRĄŠOS – KALIO TIOSULFATAS | INORGANIC FERTILISER - POTASSIUM THIOSULPHATE



**Naturamer**  
Naturing Growth, Naturally

20 L

## Naturamer KS

**NEORGANINĖS TRĄŠOS – KALIO TIOSULFATAS**  
PFK: 1(C)(I)(b)(i) PAPRASTOSIOS SKYSTOSIOS NEORGANINĖS  
MAKROELEMENTŲ TRĄŠOS  
Suminis kalio oksidas (K<sub>2</sub>O) – 24% (360 g/l), sierą (SO<sub>3</sub>) – 16,9% (253g/l).  
**TIK PROFESIONALAMS**

### LT SUDEDAMOSIOS DALYS:

SMK 1: cheminės medžiagos ir mišiniai iš grynujų medžiagų: Kalio tiosulfatas (CAS Nr. 10294-66-3, EC Nr. 233-666-8).  
Produktas yra subalansuotas tręšimo per lapus sprendimas.  
Produkte esantys kalis ir sierą turi teigiamą įtaką subalansuotam augalo vystymuisi.

### REKOMENDACIJA NAUDOJIMUI:

Prieš naudojant, pakuotės turinį gerai supurtyti!

Naudoti tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos.

<b>Rapsai, javai, ankštiniai augalai:</b> Kiekis 1 ha plotui: 1,0 – 3,0 litrai Naturamer KS į 200-300 litrų vandens.	<b>Bulvės, burokėliai, cukriniai runkeliai:</b> Kiekis 1 ha plotui: 2,0-6,0 litrai Naturamer KS į 200-300 litrų vandens.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nenaudoti produkto su mažesniu nei 100 litrų vandens kiekiu hektaro plotui bei daugiau nei 7,0 litrų produkto 1 hektaro plotui per sezoną. Nenaudoti esant ekstremalioms temperatūroms, intensyviai saulės šviesai, sausrų arba kitu nepalankiu augalams metu. Nenaudoti produkto esant didesnei nei 25°C temperatūrai.

### NAUDOJIMO LAIKOTARPIS:

Rapsas, javams ir kitiems augalams galima pradėti naudoti nuo 4 – 6 lapelių stadijos – tuomet, kai išauga pakankamai lapų purškiamam skysčiui absorbuoti. Geriausi rezultatai gaunami **Naturamer KS** purškiant ryte arba vakare, kai augaluose yra drėgmės.

### INFORMACIJA APIE SAUGĄ IR APLINKĄ:

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Turinį/talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.

Pagal reglamentą (EB) 1272/2008: neklasifikuojama kaip pavojinga medžiaga.

### SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS:

Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti vaikams, gyvūnams ir pašaliniesiems asmenims neprieinamoje vietoje. Sandėliavimo vieta turi būti gerai vėdinama ir su drenažo kontrole. Laikyti specialiu atsargumo priemonių, kad produktas nebūtų maišomas su kitais produktais. Periodiškai tikrinti talpyklą, kad būtų išvengta bet kokio nutekėjimo. Laikyti temperatūroje nuo +5°C.

### GALIOJIMO LAIKAS:

Tinkamai sandėliuojant galiojimo laikas neribojamas.

UFI: PACO-GOXA-F005-TN8C

**BS**  
CHEMICAL

**GAMINTOJAS/MANUFACTURER:**  
UAB „BS CHEMICAL“ Briedžio g. 13,  
Kretinga, Lietuva,  
www.bs-chemical.lt  
Tel.: +370 663 73748

**Naturamer KS**  
**INORGANIC FERTILISER - POTASSIUM**  
**THIOSULPHATE**  
PFC: 1(C)(I)(b)(i) STRAIGHT LIQUID INORGANIC  
MACRONUTRIENT FERTILISER  
Total potassium oxide (K<sub>2</sub>O) – 24% (360 g/l), sulphur (SO<sub>3</sub>) – 16,9% (253g/l).  
**FOR PROFESSIONAL USE ONLY**



### EN CONTENT:

CMC 1: Virgin material substances and mixtures: Potassium thiosulphate (CAS No. 10294-66-3, EC No. 233-666-8).  
The product is a balanced foliar fertilisation solution.  
The potassium and sulphur in the product have a positive effect on the balanced development of the plant.

### RECOMMENDATIONS FOR USE:

Shake the contents well before use!

Use only when there is a recognised need. Do not exceed the norm of use.

<b>Rapeseed, cereals, legumes:</b> Quantity per 1 ha: 1.0 - 3.0 litres of Naturamer KS in 200-300 litres of water.	<b>Potatoes, beetroots, sugar beets:</b> Quantity per 1 ha: 2.0-6.0 litres of Naturamer KS in 200-300 litres of water.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do not apply the product with less than 100 litres of water per hectare and more than 7.0 litres of product per hectare per season. Do not use in extreme temperatures, intense sunlight, drought or other adverse conditions for plants. Do not use the product at temperatures above 25°C.

### PERIOD OF USE:

Application to rapeseed, cereals and other crops can be started from the 4-6 leaf stage, when enough leaves have grown to absorb the spray liquid.  
The best results are obtained when **Naturamer KS** is sprayed in the morning or in the evening when the plants are moist.

### SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION INFORMATION:

Keep out of the reach of children. Dispose of the content/container in accordance with national legislation.

In accordance with Regulation (EC) 1272/2008: not classified as a dangerous substance.

### THE STORAGE CONDITIONS:

Store in a tightly closed container away from direct sunlight. Keep out of the reach of children, animals and unauthorised persons. The storage area must be well ventilated and have drainage control. Take special precautions to avoid mixing the product with other products. Periodically check containers to prevent any leakage. Store at +5°C.

### EXPIRY DATE:

With proper storage, the shelf life is unlimited.

Pagaminimo data/  
Manufacture date:

Partijos numeris/  
Batch no:

Pakuotė/  
Package: 20L